

OsmoFit

Inteligentniejsze nawodnienie dla silniejszych cieląt

Kiedy zacząć podawać

- Zaczynij, gdy tylko zauważysz objawy biegunki lub odwodnienia.
- Kontynuuj pojenie mlekiem lub preparatem mlekozastępczym, aby nadal dostarczać energię.
- NIE mieszaj OsmoFit z mlekiem – zmniejsza to skuteczność i może powodować wzdęcia lub przedłużyć biegunkę.

Jak przygotować OsmoFit

- 1 saszetka (60 g)
- Wymieszaj z 2 l letniej wody (25–35°C)
- Podawać między regularnymi posiłkami (mlekiem) przy pomocy wiaderka ze smoczkiem lub butelki.

Instrukcje dotyczące karmienia

- Podawać dwa razy dziennie przez 3–4 dni lub do momentu ustąpienia objawów odwodnienia.
- Zawsze zapewnij swobodny dostęp do czystej wody pitnej.

Praktyczne scenariusze karmienia

OsmoFit utrzymuje cielęta aktywne przy ciągłym karmieniu mlekiem, umożliwiając szybszy powrót do zdrowia przy zachowaniu ich wagi.

Scenariusz	Kiedy stosować	Podawanie OsmoFit	Karmienie mlekiem
A	Cielę nie pije mleka podczas porannego karmienia i ma biegunkę	2 l preparatu OsmoFit rano, w trakcie dnia i wieczorem (w butelce z smoczkiem/wiadrze lub przez sondę, jeśli nie ma odruchu ssania)	Podaj mleko podczas karmienia popołudniowego
B	Cielę pije mleko podczas porannego karmienia, ale nie wypija całej porcji	2 l OsmoFit po porannym karmieniu (w butelce ze smoczkiem/wiadrze lub podane przez sondę, jeśli nie ma odruchu ssania)	Podaj mleko podczas karmienia popołudniowego
C	Cielę pije mleko podczas porannego karmienia, a następnie pojawia się czynnik stresogeny (upał, dekornizacja, choroba).	2 l preparatu OsmoFit między porannym a popołudniowym karmieniem mlekiem (w butelce z smoczkiem/wiadrze).	Podaj mleko podczas karmienia popołudniowego

